

الرعاية الأولية - أداة فحص الحصبة

Primary Care Measles Screening Tool

<p>يسأل الفاحص (المساعد في العيادة الطبية MOA أو الممرض(ة)) المريض(ة) عن الأعراض التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ارتفاع في درجة الحرارة (≥ 38.3 درجة مئوية) ، و • سعال أو سيلان الأنف أو احمرار ودموع بالأعين. • ثم يسأل بعد ذلك عن: طفح ببقع حمراء على الجلد يظهر أولاً على الرأس ثم ينتشر إلى الجذع والذراعين والساقين. يحدث ظهور طفح الحصبة بعد 3-7 أيام من ظهور الأعراض. 	
<p>إذا كانت الإجابة "نعم" لما سبق، يجب على الممرض(ة) طرح الأسئلة التالية:</p>	
<p>1. هل تلقى المريض جرعتين من اللقاح المحتوي على الحصبة بعد عيد ميلاده الأول؟</p>	<p>إذا كانت الإجابة "نعم": يُعتبر المريض محصناً ضد الحصبة ويتم فحصه وفقاً للعملية الروتينية.</p>
<p>2. هل خضع المريض لفحص دم يؤكد مناعة الحصبة؟</p> <p>(أمثلة: الأجسام المضادة للحصبة (IgG) تفاعلية أو إيجابية، أو كان مستوى الأجسام المضادة للحصبة السابق لديه أكبر أو يساوي 200 مللي وحدة دولية لكل مل)</p>	<p>إذا كانت الإجابة "لا" أو غير معروف: ا طرح السؤال رقم 2</p> <p>إذا كانت الإجابة "نعم": يعتبر المريض محصناً ضد الحصبة ويجب فحصه وفقاً للعملية الروتينية.</p>
<p>3. هل أصيب المريض بالحصبة والإصابة مؤكدة مختبرياً أو تاريخ ميلاد المريض قبل 1 يناير 1970؟</p>	<p>إذا كانت الإجابة "نعم": يعتبر المريض محصناً ضد الحصبة ويجب فحصه وفقاً للعملية الروتينية.</p> <p>إذا كانت الإجابة "لا" أو غير معروف: تابع بإجراءات العزل</p>